

PROSTITUTION ET INFECTION PAR LE VIH AU CAMBODGE

P. LEGROS, S. MAM, P. GAZIN

• Travail de l'AFESIP, (P.L., Coordonateur d'AFESIP; S.M., Présidente d'AFESIP), BP 2089, Phnom Penh 3, Cambodge, de l'IRD et CFRMST (P.G., Médecin parasitologiste, Chercheur IRD), Faculté de Médecine, Marseille
• E-Mail : Pierre.Gazin@mpl.ird.fr •

Med Trop 2004; **64** : 20

Le royaume du Cambodge a connu au cours des quarante dernières années le renversement du pouvoir monarchique, la présence de l'armée du Vietnam du Nord, la guerre « américaine », la présence de l'armée du Vietnam du Sud, le pouvoir des Khmers Rouges et leur utopie meurtrière d'une société rurale « authentiquement khmère », la présence vietnamienne, la présence des Nations-Unies, l'ouverture vers l'économie de marché et le tourisme de masse.

Une tradition masculine d'usage des prostituées existe dans le pays, liée aux conceptions des rôles respectifs des hommes et des femmes ainsi qu'à celles du mariage, acte social peu chargé de valeur affective. Il s'y ajoute une demande d'activités sexuelles monnayées par des touristes se rendant dans un pays où elles sont connues pour être à un faible coût et peu ou pas réprimées par les autorités.

Les prostituées sont souvent de très jeunes femmes issues des milieux les plus pauvres, les moins instruits, souvent ruraux, du Cambodge ou du Viet Nam. Les recruteurs font miroiter des perspectives d'emplois en ville, de mariage, s'appuient sur l'endettement des familles. La réalité d'une activité de prostitution est parfois

d'emblée connue et acceptée, y compris par les familles, comme un moyen d'obtenir de l'argent (1).

L'infection par le VIH a rapidement et fortement diffusé au Cambodge. Cette diffusion est jusqu'à présent peu liée à l'usage intraveineux de drogues et essentiellement aux relations hétérosexuelles (2). Le taux d'infection par le VIH chez les prostituées varie selon diverses études ponctuelles de 41% à 54% (3, 4). Des taux élevés, supérieurs à 10%, sont observés dans des groupes d'hommes particulièrement à risque comme les militaires et les policiers.

L'emploi de préservatifs par les prostituées était rare jusqu'à ces dernières années et les maladies à transmission sexuelle fréquentes (syphilis : de 14 à 22% de séroprévalence, infection par *Chlamydia* : de 39 à 82%) (4, 5).

Cette situation a conduit des Organisations Non Gouvernementales (ONG) à développer des actions d'information auprès des prostituées et auprès de leurs clients. Actuellement, 90% des prostituées emploieraient des préservatifs masculins contre 51% en 1998 (2). L'emploi de préservatifs est lié à leur statut : toutes en connaissent l'utilité mais ce sont les

plus instruites et les mieux payées qui les utilisent. Les autres disent ne pas pouvoir persuader leurs clients de leur intérêt (6). Ces activités d'information ont reçu le soutien du Ministère cambodgien de la Santé et du Programme national VIH/sida.

La situation semble s'améliorer avec un taux d'infection par VIH évoluant chez les prostituées de 42% en 1998 à 30% en 2002 et se stabilisant autour de 3% dans la population adulte du pays (2). Le recul est cependant trop limité pour pouvoir affirmer une tendance durable à une réduction du taux d'infection. Les risques de biais dans des études réduites auprès de groupes en renouvellement rapide sont importants.

Parallèlement à la prévention, des ONG comme Agir pour les Femmes en Situation Précaire, offrent à des prostituées voulant quitter les bordels, un hébergement, une protection et tentent leur intégration sociale par l'obtention de l'indépendance financière grâce à un métier dans le commerce ou l'artisanat. Elles œuvrent également à la mise en place et à l'application d'une législation réduisant les trafics humains. Les résultats sur le long terme de ces activités pourront être jugés dans quelques années (www.afesip.org) ■

REFERENCES

- 1 - MORIO S, SODA K, TAJIMA K *et Coll* - Sexual behaviour of commercial sex workers and their clients in Cambodia. *J Epidemiol* 1999; **9** : 175-82.
- 2 - COHEN J - Two hard-hit countries offer rare success stories. *Science* 2003; **301** : 1658-1662.
- 3 - RYAN CA, VATHINY OV, GORBACH PM *et Coll* - Explosive spread of HIV-1 and sexually transmitted diseases in Cambodia. *Lancet* 1998; **351** : 1175.
- 4 - OHSHIGE K, MORIO S, MIZUSHIMA S *et Coll* - Cross-sectional study on risk factors of HIV among female commercial sex workers in Cambodia. *Epidemiol Infect* 2000; **124** : 143-152.
- 5 - SOPHEAB H, GORBACH PM, GLOYD S, LENG HB - Rural sex work in Cambodia : work characteristics, risk behaviours, HIV and syphilis. *Sex Transm Infect* 2003; **79** : e2.
- 6 - WONG ML, LUBEK I, DY BC *et Coll* - Social and behavioural factors associated with condom use among direct sex workers in Siem Reap, Cambodia. *Sex Transm Infect* 2003; **79** : 163-165.