

ACTUALITÉ DE LA MALADIE DE CHAGAS EN GUYANE

F. PAGÈS

Med Trop 2006; **66** : 402

MOTS-CLÉS • Chagas - Amazonie - Guyane - Transfusion - Importation.

L'Amazonie était considérée, malgré la présence d'un important réservoir sauvage de *T. cruzi* et de vecteurs potentiels (selvatiques et péri-domestiques), comme étant hors zone d'endémie chagasiennne. Déforestation, agriculture et urbanisation ont changé la donne. La Guyane n'est pas épargnée par cette évolution. Aujourd'hui en France métropolitaine, la notion d'un séjour en Amérique Centrale ou du Sud entraîne l'exclusion du don du sang pour 4 mois. La maladie de Chagas doit être évoquée chez un patient ayant séjourné en Amérique du Sud ou Centrale. Procédures de collecte du sang et des organes doivent s'adapter à ce nouveau risque ■

• Travail de l'Unité d'entomologie médicale du Département d'épidémiologie et de santé publique (F.P., Docteur en médecine, Spécialiste en Santé publique, Entomologiste médical), Institut de médecine tropicale du Service de santé des armées, Marseille, France.

• Correspondance : F. PAGES, DESP, IMTSSA, BP 46 Le Pharo, 13998 Marseille Armées, France.

• Courriel : imtssa.entomo@wanadoo.fr